

МБУ «Новолеушковская сельская библиотека имени И.И.Никонова»

Цена зависимости - ЖИЗНЬ

Сниффинг

смертельно опасная зависимость у детей.

Сниффинг –это форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания паров химических соединений, используемых в бытовых приборах газа, летучих веществ, входящих в состав освежителей воздуха, дезодорантов, а также выделяемых из горючих жидкостей, таких как растворители, бензин и клей, которые имеют свободное обращение в гражданском обороте.

Группа риска дети от 9-17 лет.

Причины употребления

- Психологические особенности ребенка
- Социальные проблемы (семейное неблагополучие, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и т.д), с которыми подросток сталкивается в жизни
- Стремление убежать от действительности и искать «кайф»
- Стремление показать себя причастным к группе сверстников, в которой вдыхают ядовитые пары
- Интерес

Подозрения у родителей о возможном употреблении ребенком токсических веществ должны возникнуть, если:

- От одежды появился специфический запах бытовой химии
- Координация движений нарушается, ребенок, как правило, ведет себя как пьяный, но запаха алкоголя не ощущается
- Зрачки расширены, слезятся глаза, покраснение склер (белка глаза)
- Гиперемия (покраснение) лица, в случае тяжелого отравления – бледность
- Область носогубного треугольника приобретает синюшный оттенок
- Агрессивность ребенка или вялость и апатия
- Если застали ребенка на стадии галлюцинаций-нарушена ориентация в месте и времени, отмечается эйфория, безудержный смех
- При выраженной интоксикации- тошнота, рвота, головокружение, вплоть до потери сознания

Как токсикомания влияет на подростка

В крови гемоглобин переносит кислород и, таким образом, человек дышит. Пропан и бутан «вытесняют» кислород из гемоглобина, возникает кислородное голодание, которое приводит к галлюцинациям. Бытовой газ -это психоактивное вещество, то есть он сразу влияет на головной мозг человека. Как и с наркотиками-все начинается с малой дозы, например, одного вдоха. При начальных этапах употребления подростков одолевает безудержный смех. При более длительном употреблении наступают галлюцинации. По мере употребления, у детей формируется физическая и психическая зависимость, которые требуют обязательного лечения.

Физическая зависимость проявляется тошнотой, судорогами, головной болью. Токсикоманы страдают нарушением сна, бессонницей.

Психическая зависимость возникает в результате нарушения обмена дофамина- вещества, вырабатываемого в головном мозге и влияющего на эмоции, мотивацию человека. У ребенка, употребляющего токсические вещества, появляется раздражительность, агрессивность, перепады настроения.


Последствия

- Пропан, бутан и изобутан при вдыхании способны вызывать мерцательную аритмию (нарушение ритма сердца, сопровождающееся частым, хаотичным возбуждением и сокращением предсердий или подергиванием, фибрилляцией отдельных групп предсердных мышечных волокон). За мерцательной анемией может последовать смерть.
- Смерть наступает из-за асфиксии от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе. Остановка дыхания может произойти прямо на вдохе – настолько быстро пары токсинов достигают мозга.
- Хроническое отравление мозга газом приводит к токсической энцефалопатии. Внешне это проявляется задержкой развития, катастрофическим снижением интеллекта. Круг интересов подростка ограничивается единственным стремлением – дыхнуть еще раз пары ядов.
- Подростки не в состоянии сосредоточиться на уроке, резко отстают по программе, не способны усваивать новый материал.

Как разговаривать со sniffером?

1) Важно помнить, что sniffер — это ваш ребёнок, которого вы любите. Как бы тяжело не было, не кричите и не ругайте. В момент разговора нужно как можно деликатно подойти к выяснению вещества, которое употребляет и (или) вдыхает ребёнок.

- Если разговор пойдёт в ключе угроз, криков— это приведёт к тому, что ребёнок закроется в себе. Вы потеряете нить привязанности и из родителя превратитесь в обвинителя.




2) Следующий шаг после выяснения природы вещества — это проговорить опасность. Поставьте в ряд алкоголь, наркотики, табак и токсикоманию. Дети по незнанию думают, что токсикоманить — это не тоже самое, что наркоманить. Разве продавали бы зажигалки и баллончики детям, если бы они были опасны? А они опасны, но ваш ребёнок может этого не знать.

3) Выясните, с кем ребёнок в компании вдыхал газ, не делал ли это под принуждением.

Присмотритесь к его окружению, пусть чаще приглашает друзей в гости, чтобы вы имели представление с кем он общается. Не будьте наивны и не верьте, что «он больше никогда». Доверие — это хорошо, но в случае токсикомании опасно.

- Это опасная зависимость, которую нужно лечить не родителям. Обратитесь за помощью к специалистам в реабилитационный центр.**

A thick blue horizontal bar spans the top of the slide, with a smaller blue square positioned at the top right corner.

**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ**