

Острая кишечная инфекция (ОКИ)



брюшной тиф,
паратиф А и В

кишечные инфекции, вызываемые сальмонеллами, при которых наблюдается циркуляция сальмонелл в крови, увеличение лимфатических узлов, печени, селезенки.



дизентерия

кишечная инфекция, вызываемая шигеллой, протекающая с явлениями выраженной интоксикации и поражением преимущественно конечного отдела толстого кишечника.



холера

кишечная инфекция, передающаяся от человека к человеку, вызываемая холерным вибрионом и характеризующаяся обезвоживанием, потерей электролитов из-за рвоты и диареи. Среди всех ОКИ - это наиболее заразное заболевание.



сальмонеллез

острая кишечная инфекция, передающаяся от животных человеку, проявляется поражением желудочно-кишечного тракта.



пищевые
токсикоинфекции,
пищевые отравления

острые заболевания, вызываемые микроорганизмами, способными выделять токсины вне организма человека (в продуктах питания), в результате воздействия этих токсинов поражаются верхние отделы желудочно-кишечного тракта, нарушается водно-солевой обмен.



ботулизм

кишечная инфекция, которая возникает под воздействием особого токсина, вырабатываемого палочкой ботулизма, при которой поражается продолговатый и спинной мозг и развивается паралич мышц.



вирусный
гастроэнтерит
(вирусная диарея)

группа кишечных инфекций, вызываемая различными вирусами, при которых наблюдается интоксикация организма и поражение пищеварительного тракта. Самые распространенные заболевания этой группы: ротавирусная инфекция (кишечный грипп), энтеровирусная инфекция.



иерсиниоз

острое инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт и другие внутренние органы. Бактерия иерсиния чаще всего попадает в организм человека от животных-носителей (собаки, крысы).

СРОЧНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ НУЖНА:

- ДЕТЯМ ДО 3-Х ЛЕТ
- ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
- КОГДА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ДИАРЕЯ И РВОТА, УПАЛО АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
- КОГДА БОЛЬ В ЖИВОТЕ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, ПОЯВЛЯЕТСЯ КРОВЬ В КАЛЕ
- КОГДА ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ 39-40 °C

