



*Первая медицинская  
помощь  
при травмах  
опорно-двигательного  
аппарата*

**Травма** (от греч. *trauma* – рана) –  
это нарушение тканей организма  
человека с нарушением их  
целостности и функций,  
вызванное внешним воздействием.


*Травмы, в зависимости от способа воздействия на организм человека, могут быть механические, тепловые, холодовые, химические, радиационные.*






# *Перелом – это нарушение целостности кости*

*Переломы бывают закрытые и открытые*



## **Признаки закрытого перелома:**

- сильная боль при движении и при нагрузке на конечность;
- деформация и отёк конечности;
- синюшный цвет кожи.




## **Признаки открытого перелома:**

- видны костные обломки;
- деформация и отёк конечности;
- наличие раны, часто с кровотечением.





# *Первая медицинская помощь при закрытых переломах*

При закрытом переломе следует обеспечить покой повреждённой конечности, для чего накладывают специальную шину, затем дают обезболивающее средство, после чего обязательно доставляют пострадавшего к врачу




# *Первая медицинская помощь при открытых переломах*

При открытом переломе следует остановить кровотечение, наложить стерильную повязку, обеспечить покой повреждённой конечности, наложить специальную шину, дать обезболивающее средство, доставить пострадавшего к врачу.




# *Основной способ оказания первой помощи пострадавшему при переломах – наложение шинной повязки.*

*При наложении шины должны фиксироваться два ближайших сустава:  
один - выше места перелома, другой - ниже.*



ПРИ ПЕРЕЛОМЕ  
ОДНОЙ КОСТИ ГОЛЕНИ



ПРИ ПЕРЕЛОМЕ  
ГОЛЕНСТОПНОГО СУСТАВА



ПРИ ПЕРЕЛОМЕ  
ОБЕИХ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ




# *Вывих – это смещение кости по отношению к ее нормальному положению в суставе.*

При вывихе наблюдаются: изменение формы сустава, неестественное положение конечности, изменение её длины, сильная боль в суставе и невозможность движения.




При вывихе необходимо обеспечить покой вывихнутому суставу, дать обезболивающее средство пострадавшему и без промедления обратиться к врачу-травматологу.




# *Растяжение и разрыв связок происходит, когда кость выходит за пределы обычной амплитуды движения.*

При растяжении нельзя нагружать поврежденный сустав. В первые 72 часа не применяйте согревающие компрессы. Это усугубит травму.



При растяжении связок на место травмы положить холод, наложить тугую повязку, придать конечности возвышенное положение и обратиться к врачу.

*Симптомы **растяжения связок и мышц** сходны, хотя некоторые признаки могут отличать одну травму от другой.*





При **разрыве** наблюдается сильная боль, отёк сустава, синюшность кожи в районе травмы

В месте разрыва мышц на коже образуется видимое на глаз западение, ниже которого заметно выпячивание.

ПРИЗНАКИ РАЗРЫВОВ СВЯЗОК И МЫШЦ



## Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц

1. На поврежденное место положить холод

2. Наложить тугую повязку и обеспечить покой

3. В качестве обезболивающего средства дать пострадавшему таблетки анальгина

4. Для уменьшения отека конечности, ей следует придать возвышенное положение

5. Обратиться к врачу