

## **Педикулёз.**

**Педикулез (вшивость)** - это паразитарное заболевание кожи возбудителем, которого является человеческая вошь – мелкое насекомое, паразитирующее на коже и одежде. Проявляется педикулез, в основном, зудом в месте укусов вшей (зуд кожи головы, зуд в области половых органов).

### Виды человеческих вшей

- Головные паразиты (осуществляют поражение височной и затылочной части, реже появляются на всей голове);
- платяные насекомые обитают в одежде, в ее швах и складках, иногда перебираются на тело, чтобы получить пищу и укусить жертву;
- лобковые вши обычно ведут жизнедеятельность в паховой области, реже – на других частях кожного покрова.

Причины возникновения педикулеза. Как правило, педикулез развивается при неблагоприятных условиях внешней среды. Иногда вшивость возникает и у чистоплотных людей при контакте с зараженным вшами человеком.

Головной педикулез. Причиной головного педикулеза является головная вошь. Головные вши живут до 40 дней. В течение 35 дней вошь откладывает до 10-12 яиц (гнид) в день. Обычно гниды крепятся на волосах и выглядят как прозрачные округлые мешочки, наполненные жидкостью. После выхода из яйца (гниды) молодая вошь начинает питаться кровью человека и расти. Головные вши живут на волосистой части головы. Как правило, заражение вшами происходит через расчески, головные уборы, щетки для волос. Также возможен и переход паразита с одного человека на другого.

Основными симптомами и признаками педикулеза являются:

- Кожный зуд в месте укуса вши. При головном педикулезе наиболее часто больных беспокоит зуд кожи головы .
- Сыпь как симптом наличия вшей. Как правило, сыпь при педикулезе проявляется спустя несколько дней после укусов вшей.
- Расчёсы. При длительном течении педикулеза из-за зуда больной расчесывает участки кожи, покусанные вшами. Как правило, на месте расчесов при вшивости появляются гнойные корочки.
- Наличие гнид на волосах это один из неопровержимых признаков вшей. Гниды выглядят как маленькие (2-3 мм) серебристые пузырьки, прикрепленные к волосам.

Профилактика педикулеза.

- Профилактика педикулеза заключается в соблюдении гигиенических мер.
- Соблюдение личной гигиены.

Осложнения при педикулезе.

- Вторичная бактериальная инфекция (пиодермия) на коже головы.
- Блефарит, конъюнктивит;
- Лимфаденит;
- Сыпной тиф ;
- Сепсис.