

КАКИЕ ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА :

Кашель, продолжающийся более 2-х недель, не поддающийся лечению обычными лекарственными средствами; боли в груди; откашливание слизистой или гнойной мокроты, иногда с кровью; общее недомогание, слабость; плохой аппетит; снижение массы тела; периодическое повышение температуры тела, озноб; сильная потливость, особенно в ночное время.

Если ты заметил у себя или у своих близких эти признаки необходимо срочно: Определить состояние легких, так как чаще всего туберкулезом поражаются органы дыхания. Пройти флюорографию или рентгенографию легких.

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует в первую очередь, провести исследование мокроты на наличие туберкулезных палочек.



Это можно сделать в территориальной поликлинике. Потратив на это время один раз в год, ты будешь знать, что здоров и будешь спокойно спать. Если же на снимке вдруг будут выявлены изменения, не надо паниковать. Чем раньше будут выявлены изменения, тем скорее будет начато лечение и выздоровление наступит быстрее. Оттягивая по времени визит к врачу, ты рискуешь получить более запущенную форму туберкулеза, которую гораздо труднее лечить.



МБОУ СОШ 11


Разработал :
Советник директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными объединениями

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа №11
имени А.М. Матросова села
Школьного муниципального
образования Белореченский
район

**НЕ ДОПУСТИ
ТУБЕРКУЛЕЗ!**

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ С
ТУБЕРКУЛЕЗОМ


24
марта



С. ШКОЛЬНОЕ 2024 Г.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА?

Туберкулез излечим только при условии прохождения полного курса лечения специальными противотуберкулезными препаратами. Курс лечения длится не менее 6 месяцев, а при тяжелой форме более 9 месяцев. Возбудители туберкулеза очень живучи! Поэтому курс лечения нужно непрерывно продолжать, строго следуя предписаниям врача, даже если больной почувствовал себя лучше после первых недель приема лекарств. Если не соблюдать правила лечения - то болезнь обязательно вернется и тогда победить её будет гораздо сложнее! Не прерывай и не прекращай лечение преждевременно!



Существует три несложных правила, соблюдение которых сможет максимально снизить вероятность заражения ребенка туберкулезом

Здоровый образ жизни

Для предупреждения заболевания туберкулезом необходимо направить усилия родителей на повышение защитных сил организма ребенка:



- Контролировать соблюдение режима дня;
- Обеспечивать полноценное питание;
- Организовывать регулярные занятия по физической культуре;
- Обеспечивать соблюдение малышом правил гигиены

Вакцинация БЦЖ

Прививка БЦЖ является на сегодняшний день самой надежной защитой от туберкулеза. БЦЖ – это вакцина, содержащая ослабленные микобактерии туберкулеза. Вакцинация БЦЖ проводится в родильном доме здоровым новорожденным на 3-7 сутки жизни, для ослабленных или маловесных детей используют вакцину БЦЖ-М, которая содержит вдвое меньше микробных клеток, но также защищает малыша. Противотуберкулезный иммунитет после вакцинации БЦЖ будет защищать ребенка на протяжении 4-6 лет. В дальнейшем вакцинацию БЦЖ повторяют ребенку в возрасте 7-14 лет .



Ежегодная проба Манту Проба Манту – это не прививка, а диагностический тест для выявления инфицирования: ребенку внутривенно вводится туберкулин (частички оболочек возбудителя болезни). Запомните: туберкулин не содержит живые микобактерии, а потому спровоцировать развитие туберкулеза он не может.

Туберкулинодиагностика – общепризнанный, доступный и безопасный метод распознавания туберкулеза на ранних стадиях у детей. Ее нужно делать регулярно раз в год независимо от предыдущего результата, или дважды в год, если ребенку не сделана прививка БЦЖ и его организм пока не защищен вакциной .

Не игнорируйте советы врачей, подумайте о здоровье Вашего ребенка!

МБОУ СОШ 11

с.Школьное, 2024г.

Телефон: 8(861) 557-52-97
Эл. почта: soch11@mail.ru