



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ



Центр  
Общественного  
Здоровья  
и Медицинской профилактики  
Пермский край



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ





Центр  
Общественного  
Здоровья  
и Медицинской профилактики  
Пермский край

# ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ

**ГБУЗ ПК «Центр  
общественного здоровья и  
медицинской профилактики»  
ул.Пушкина, 85  
(пересечение ул.Пушкина и ул.Попова)  
236-44-31**



**БЕРЕГИ ЖИЗНЬ,  
ИЗМЕРЯЙ ДАВЛЕНИЕ!**











## ДНЕВНИК ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Дата	Утро		Вечер		Комментарий
	АД	Пульс	АД	Пульс	

## ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

- Проводите измерение, сидя в удобной позе, опираясь на спинку кресла, рука, на которой проводится измерение, должна лежать на столе.
- Мышцы руки должны быть расслаблены.
- Одежда не должна сдавливать руку.
- Манжета тонометра накладывается на плечо на уровне сердца, нижний край ее должен быть на 2 см выше локтевого сгиба.
- Артериальное давление измеряется в спокойном состоянии после 5-минутного отдыха. В случае, если процедуре измерения предшествовали физические или эмоциональные нагрузки, увеличьте период отдыха перед измерением до 15 минут.
- Во время измерения нельзя разговаривать или двигаться.
- Размер манжеты должен соответствовать размеру руки.

## ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ

— это состояние, проявляющееся высоким артериальным давлением (АД)

(систолическое или «верхнее» АД, как правило, более 180 мм рт. ст.; диастолическое или «нижнее» АД — более 100 мм рт. ст.).

### СИМПТОМЫ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА

- головная боль, чаще в затылочной области, или тяжесть и шум в голове;
- мелькание «мушек», пелена или сетка перед глазами;
- тошнота, чувства разбитости, переутомления, внутреннего напряжения;
- одышка, слабость, постоянные монотонные ноющие боли/дискомфорт в области сердца, иногда появление или нарастание пастозности / отечности кожи лица, рук, ног.

### ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

1. Необходимо убрать яркий свет, обеспечить покой и доступ свежего воздуха.
2. Измерить артериальное давление и если его «верхний» уровень выше или равен 160 мм рт. ст., надо принять гипотензивный препарат, ранее рекомендованный врачом. При отсутствии рекомендованного врачом гипотензивного препарата или при регистрации уровня АД выше 200 мм рт. ст. — срочно вызвать скорую помощь.
3. До прибытия скорой медицинской помощи необходимо усадить человека в кресло с подлокотниками и сделать ему горячую ножную ванну. Внимание! Человеку с гипертоническим кризом запрещаются любые резкие движения.
4. Через 40–60 мин после приема лекарства, рекомендованного врачом, повторно измерить давление, и если его уровень не снизился на 20–30 мм рт. ст. от исходного и/или состояние не улучшилось, срочно вызвать скорую помощь.

## ДНЕВНИК ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Дата	Утро		Вечер		Комментарий
	АД	Пульс	АД	Пульс	

















