

# Буклет

## Для родителей

### Как прививки защищают детей

Статистика, вакцины,  
рекомендации,  
ваш личный график




### График вакцинации ребенка

Название прививки	Кратность	Дата проведения	Комментарии
Коклюш, дифтерия, столбняк			
Корь			
Краснуха			
Паротит			
Полиомиелит			
Гепатит В			
Пневмококк			
Менингококк			
Грипп			

### Все вакцины безопасны и эффективны:

- все вакцины лицензированы;
- прошли многоступенчатую проверку;
- перевозятся под жестким контролем непрерывности холодовой цепи;
- эксперты анализируют и учитывают осложнения и реакции на вакцинацию;
- иммунизация проводится только при отсутствии противопоказаний.



Линия сгиба

e.doumed.ru

Линия сгиба

## Привитые дети меньше болеют

- Вакцинация не дает стопроцентной гарантии, что ребенок не заболееет, но у привитых детей заболевание протекает в легкой форме.
- Вакцинация снижает частоту и тяжесть осложнений.
- Среди привитых детей снижается циркуляция возбудителей.

## Статистика за 2020 год

### Вакцинация снизила число

**заболеваний:** инфекционным паротитом – в 2,2 раза, ветряной оспой – в 2,6 раз, гепатитом А – в 2 раза, туберкулезом – на 14,6%, гриппом – на 24,2%, клещевым энцефалитом – на 11,6%, гепатитом В – на 22%.

### Отказ от вакцинации привел к росту заболеваемости:

коклюшем – в 1,9 раз,  
корью – в 3,5 раза,  
менингококком – на 19,3%.

Линия сгиба

## Как ухаживать за ребенком после инактивированной прививки

Первые трое суток наблюдайте за состоянием и поведением ребенка. Если у него температура поднимается до 38,5 °С и выше, место укола больше 5 см в диаметре, отмечается общее ухудшение состояния, непривычное поведение ребенка, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Но это не осложнения прививки.

### Как ухаживать за ребенком:

- при легком недомогании дайте жаропонижающий препарат в возрастной дозировке;
- если температура выше 38,5 и место укола больше 5 см в диаметре, вызовите скорую помощь

### От каких заболеваний делают инактивированные прививки:

коклюш, дифтерия, столбняк, инактивированный полиомиелит, вирусный гепатит В, пневмококк, менингококк, гепатит А, клещевой энцефалит, гемofilльная инфекция

Линия сгиба

## Как ухаживать за ребенком после получения им живой полиомиелитной вакцины

Две недели после вакцинации контролируйте состояние здоровья и поведение ребенка. Температура может подниматься не выше 38 °С.



### Как ухаживать за ребенком:

- в течение 60 дней не разрешайте общаться с непривитыми детьми;
- в день вакцинации ограничьте прогулки и водные процедуры;
- избегайте общественных мест, чтобы свести к минимуму риск контакта с инфекциями;
- не давайте новые продукты, чтобы избежать аллергических реакций.

### От каких заболеваний

**делают прививки живой**

**вакциной:** корь, краснуха, паротит, ВПЧ-М, ветряная оспа.