

ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница»  
министерства здравоохранения Краснодарского края

# Грипп и ОРВИ у детей

Н.Х.Тхакушинова – д.м.н., главный врач, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения Краснодарского края

Краснодар, 26.09.2018 г.

# ВОЗ

- 10-15% населения Земли ежегодно болеют гриппом
- 3-5 млн случаев тяжелого течения заболевания
- 250-500 тыс. летальных исходов

# **Грипп и ОРВИ в России**

- До 90% в структуре инфекционной заболеваемости.
- 2017г. – 31 876 882 случаев ОРВИ и гриппа в РФ, что составило 34,9 случаев гриппа на 100 тыс. населения.
- 2016 г.- 60,5 на 100 тыс.населения.
- На ОРВИ и грипп приходится 82% от всего экономического ущерба.

# **«Пандемический грипп»**

- Пандемия гриппа – глобальная эпидемия, вызванная новым вирусом гриппа, против которого в человеческой популяции нет исходного иммунитета или он весьма низок.
- Возникновение пандемий гриппа невозможно прогнозировать (НАДЗОР!)
- От легких до тяжелых форм заболевания
- Тяжелые формы возникают в определенных группах риска, которые могут совпадать с аналогичными группами риска в отношении тяжелых форм сезонного гриппа.
- У здоровых лиц, не входящих в группы риска, во время пандемии чаще возникают более тяжелые формы заболевания по сравнению с сезонным гриппом.
- Последняя пандемия в 2009 г.:
  - вызвана вирусом гриппа А(H1N1)
  - от 100 000 до 400 000 случаев смерти только за первый год.

# **Клинические особенности пандемического гриппа А (H1N1)pdm09**

1. Поражение всех возрастных групп населения;
2. Быстрое поражение нижних дыхательных путей с развитием альвеолита, бронхиолита, тяжелой вирусной пневмонии, ОРДС и геморрагического отека легких;
3. Поражение ЖКТ в виде тошноты, рвоты и жидкого стула в дебюте заболевания;
4. Поражение микроциркуляторного русла с развитием микротромбозов и связанных с ним осложнений;
5. Особая тяжесть течения и возможность крайне серьезного прогноза у пациентов из «группы риска»;
6. Преимущественное поражение невакцинированных пациентов.

# Клинические проявления пандемического гриппа A(H1N1)pdm09

Интоксикационный синдром:	<p>Повышение температуры тела (82%) Слабость (59%) Боли в мышцах, ломота в суставах (48%) Головная боль (47%)</p>
Катарально-респираторный синдром:	<p>Кашель (98%) Одышка (51%) Боль в горле (50%) Фарингит (39%) Насморк (33%) Рентгенологические находки: мультифокальные изменения (27%), унифокальные изменения (18%), без патологических изменений (50%), плевральный выпот (4%)</p>
Поражение ЖКТ:	<p>Тошнота, рвота (18%) Диарея (13%)</p>

# Осложнения гриппа

Среди наиболее опасных и распространенных осложнений можно выделить:

- Бронхит;
- Синусит или гайморит;
- Отит;
- Пневмония;
- Миозит;
- Энцефалит;
- Миокардит;
- Менингит;
- Недостаточность сердечной мышцы;
- Пиелонефрит;
- Перикардит;
- Гломерулонефрит.

У больных с наличием хронических форм недугов часто происходят рецидивы в процессе поражения гриппом или после его устраниния.

# **Факторы риска тяжелой степени тяжести и неблагоприятных исходов гриппа**

- Пневмоторпный вирус гриппаA(H1N1) pdm09
- Отсутствие вакцинации в данный эпидсезон
- Позднее обращение за медицинской помощью и отсутствие противовирусной терапии в первые 3 суток болезни
- Возраст младше 2 или старше 65 лет
- Беременность
- Прием препаратов ацетилсалициловой кислоты (аспирина)
- Неблагоприятный преморбидный фон: -метаболический синдром (ожирение, сахарный диабет)
  - -заболевания сердца и сосудов
  - - воспалительная кардиомиопатия или миокардит в анамнезе, пороки сердца или миокардит в анамнезе, пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь
- Заболевания дыхательной системы- пороки развития, бронхолегочная дисплазия, ХОБЛ, бронхиальная астма
- Иммунодефицитные состояния, включая ВИЧ-инфекцию.

# Летальные исходы от гриппа в РФ

- 2006 г. – 309 человек.
- 2009 г. – 622 человека.
- Летальные исходы наблюдались чаще при гриппе A(H1N1) pdm09.

## Дополнительная смертность:

- сердечно-сосудистые+заболевания легких – 870 на 100 000 населения,
- сердечно-сосудистые+сахарный диабет – 481 на 100 000 населения.

Смертность среди здоровых взрослых без соматической патологии 2 на 100 000 населения.

# Осложнения гриппа у детей в сезон 2016-2017 гг. и 2017-2018 гг.

По данным ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России,  
СПб



В сезон 2016-2017гг. зарегистрировано 38 случаев летального исхода от гриппа с выделением вируса А(H3N2) и В (4 случая).

В сезон 2017 -2018 гг. большинство тяжелых случаев были вызваны вирусами гриппа типа В и возникали преимущественно у лиц старше 15 лет

Количество случаев и этиологическая структура гриппа у детей с летальным исходом в РФ:

2015-2016гг. - 16 человек А(H1N1)pdm09

2016-2017гг. – летальных исходов у детей не было

2017-2018гг. - 6 человек:

грипп А(H1N1)pdm09 - 3 человека

грипп А(H3N2) – 1 человек

грипп В - 2 человека

# **Причины летальных исходов от гриппа у детей в РФ по данным анализа медицинской документации в ДНКЦИБ**

Причины:

- Двусторонняя пневмония, осложненная острым респираторным дистресс-синдромом взрослого типа (ОРДСв),
- Отек головного мозга (ОГМ) с дислокацией ствола,
- Менингоэнцефалит с ОГМ,
- Кардит с развитием недостаточности кровообращения (НК),
- Инфекционно-токсический шок (ИТШ).

У большинства больных с гриппом А(H1N1)pdm09 имелся комплекс жизнеугрожающих нарушений ритма сердца.

У одного ребенка с гриппом В на фоне неверифицированного иммунодефицитного состояния развился некротический ларинготрахеит.

# Профилактика

- Вакцинация – наиболее эффективная мера профилактики гриппа
- В 2017 г. в России привито наибольшее количество населения за всю историю вакцинопрофилактики гриппа (!)
- 46,6% от численности населения
- 67,4 млн человек
- В том числе >17млн детей

**Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»**

**Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики**

**2. Отсутствие профилактических прививок влечет:**

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- **отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.**



В 2011-2015 гг. прививалось:

~40 млн человек в год = ~27% населения страны

**По расчетным данным, вакцинация снижает**

Вероятность заболеть гриппом	Вероятность тяжелого течения гриппа
В 2,7 раза	В 11,2 раза

# **ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию, прежде всего, лиц из групп высокого риска**

- Дети в возрасте от 6 мес до 5 лет
- Беременные в любом периоде беременности
- Пожилые люди
- Лица с хроническими заболеваниями
- Работники здравоохранения

# **Конtingенты, подлежащие иммунизации против гриппа по Национальному календарю прививок в РФ**

- Дети с 6 месяцев
- Учащиеся 1-11 классов
- Обучающиеся в высших и средних учебных заведениях
- Работники медицинских и образовательных учреждений транспорте, коммунальной сферы
- Лица старше 60 лет
- Беременные
- Лица, подлежащие призыву на военную службу
- Лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением

# **Антигенная характеристика вирусов гриппа в 2017-2018 гг.**

- Антигенно охарактеризовано 710 вирусов гриппа
  - ✓ 242 вириуса A(H1N1)pdm09
  - ✓ 52 вириуса гриппа A(H3N2)
- Все вириусы гриппа A(H1N1) pdm09 и A(H3N2) близкородственны штаммам A/Мичиган/45/2015 и A/Гонконг/4801/2014, включенным в состав гриппозных вакцин в 2017-2018гг.
- ✓ 316 вириусов гриппа типа В
- 9 вириусов гриппа типа В отнесены к линии Виктория и были близко родственными 0+ референс-штамму B/Брисбен/60/2008
- 305 штаммов гриппа типа В относились к линии Ямагата и были подобны референс-штамму B/Пхукет/3073/2013

Прошедший эпидсезон характеризовался ко-циркуляцией гриппа В двух линий, что привело к резкому росту заболеваемости и госпитализации

# **Предварительный прогноз предстоящей эпидемии 2018- 2019гг.**

- Ожидается развитие эпидемии средней интенсивности с участием всех трех возбудителей сезонных эпидемий A(H1N1) pdm09, A(H3N2), B.
- Предполагается, что в дополнение к вирусам гриппа В Ямагатской линии, которые доминировали в прошлом сезоне, возможна циркуляция вирусов гриппа В Викторианской линии (отличного от вакцинного штамма прошлого года).
- Прогноз носит предварительный характер и будет уточнен по итогам анализа возбудителей гриппа эпидемического сезона в Южном полушарии в конце сентября 2018г., а также по результатам антигенной характеристики первых изолятов в России сезона 2018-2019гг.

# **Рекомендации ВОЗ по штаммовому составу вакцин на сезон 2018-2019гг. для Северного полушария**

- A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09- подобный
  - A/Singapore/INFIMH -16-0019 (H3N2)-подобный\*
  - B/Colorado/06/2017-подобный (Victoria lineage)\*
- Для квадривалентных вакцин дополнительно
- B/Phuket/3073/2013 (Yamagata lineage)
  - В состав тривалентной вакцины включен вирус Викторианской разновидности

# **Безопасность вакцины**

- Система оценки безопасности вакцин включает 5 уровней контроля:
  - 1.Испытания новых вакцин разработчиком и национальным органом контроля
  - 2.Контроль вакцин на производстве
  - 3.Сертификация серий вакцин
  - 4.Инспектирование предприятий
  - 5.Госконтроль соответствия качества вакцин на местах их применения  
(соблюдение правил хранения, транспортирования и применения вакцин)

# Порядок подготовки гриппозных вакцин

ВОЗ

- Конец февраля-начало марта

Объявление штаммов для включения в состав гриппозных вакцин для северного полушария

- В Российской Федерации

Апрель-июль

Производство вакцин, проведение контроля качества на всех этапах производства

Длительность процесса – 4-5 месяцев

К августу

Проверка вакцины на реактогенность и иммуногенность

В период с сентября по ноябрь – массовая вакцинация населения

# **Квадривалентная вакцина против гриппа**

- 6 производств в мире: Германия, Франция, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия
- Живая (Q/LAIV) и инактивированная (I/QIV)
- Россия – квадривалентная инактивированная вакцина

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**