

Дети-пассивные курильщики



Пассивное или активное курение во время беременности может привести к ее прерыванию или появлению серьезных нарушений внутриутробного развития ребенка;

- на 28% повышается риск мертворождения и смертности новорожденных;
- риску рождения ребенка с низким весом в два раза больше, чем у некурящих;
- происходит недостаточное образование молока;




У детей-пассивных курильщиков существенно снижается иммунитет.

Они чаще:

- болеют респираторными заболеваниями;
- страдают заболеваниями среднего уха;
- страдают хроническими бронхитами;



Курение одного и, особенно, обоих родителей увеличивает в несколько раз вероятность курения ребенка в будущем.



2015 — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОД БОРЬБЫ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Желаем Вам здоровья!



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АМИ

Российское агентство медико-социальной информации АМИ
для Министерства здравоохранения Российской Федерации

КАК оградить ребенка от вредных привычек?



Материал разработан
ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины»
Минздрава России