

Первая помощь ребенку, если он съел ядовитые растения

Симптомы отравления:

Сухость во рту, жжение слизистых рта и носа, осиплость голоса, нарушение глотания, слюнотечение. Кожная сыпь. Жажда, тошнота, рвота, задержка мочеиспускания. Боль в животе, диарея. Головокружение, недомогание, сонливость, потеря ориентации, сознания, судороги, буйное состояние.

Первая помощь: 1. Заглянуть ребенку в рот, чтобы выяснить, что он жевал. 2. Удалить остатки растения изо рта. 3. Вызвать медработника детского сада, если его нет – звонить в скорую помощь – **112, 103**. 4. Дать выпить большое количество теплой воды, затем вызвать рвоту.

Ядовитые растения

Белена черная



Клещевина обыкновенная
(ядовитые бобы)



Волчьи ягоды



Дурман обыкновенный
(ядовиты все части растения)



Паслен черный



Амброзия





Первая помощь, если ребенка ужалила оса

Для детей опасны укусы пчел, ос, слепней. Если насекомое ужалило в глаза и слизистые рта, губы – это очень опасно, так как может привести кудушью, нарушению зрения.

Симптомы при укусах:

1. Жгучая боль, местная реакция – покраснение и отек в месте укуса.
2. Озноб, повышение температуры, одышка, головокружение, головная боль, учащение сердцебиения, боли в области сердца, судороги, обморок.

Первая помощь

1. Удалите жало из места укуса.
2. Обработайте антисептическим средством, или влажными гигиеническими салфетками, или промойте ранку водой с мылом.
3. Приложите холод к месту укуса.
4. Если начинается аллергическая реакция с большим отеком или удушьем – вызывайте медработника детского сада или скорую помощь – **112, 103**



Первая помощь, если ребенка укусил клещ

Если ребенка укусил клещ, после осмотра необходимо:

- вызвать медработника детского сада;
- при отсутствии медработника самостоятельно аккуратно удалить клеща;
- если не получается вытащить – как можно скорее обратиться в ближайший стационар или амбулаторное медучреждение;
- измерить температуру ребенку;
- дать рекомендации родителям наблюдать за самочувствием ребенка и обратиться к врачу при ухудшении

Как удалить клеща

1. Возьмите клещедёр или нитку, пинцет – что есть под рукой. Захватите клеща ближе к коже – не за брюшко – и осторожно потяните. Если в ранке остался хоботок, извлеките как обычную занозу.
2. Нельзя: давить на брюшко клеща, заливать его раствором, маслом.
3. Обработайте ранку антисептиком или промойте водой с мылом



Как помочь ребенку при тепловом или солнечном ударе

Солнечный ожог	Тепловой удар
Симптомы	
<p>Покраснела кожа Зуд Чувство жжения Небольшая отечность Ноющая боль Признаки теплового удара</p>	<p>Покраснело лицо Общая вялость, сонливость, кружится голова, потемнело в глазах Сильно болит голова Кровь из носа Тошнота, рвота Частый и слабый пульс, одышка Горячая бледная или синюшная кожа Поднялась температура Холодный пот</p>
Первая помощь	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Вызовите скорую, если у ребенка обширная площадь ожогов, сильное беспокойство или сонливость, высокая температура. 2. Быстро отведите или перенести ребенка в затемненное прохладное помещение. 3. Наложите холодный компресс на место ожога. Меняйте по мере нагревания. 4. Дайте выпить много воды или сладкого чая. 5. Успокойте ребенка и максимально отвлеките его от полученной травмы. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вызовите медработника детского сада или скорую помощь – 112, 103. 2. Унесите или отведите ребенка в прохладное помещение или тень. 3. Разденьте и уложите ребенка на ровную поверхность, приподнимите голову. 4. Дайте выпить много воды или сладкого чая. 5. Оботрите кожу водой, оберните ребенка мокрой простыней, положите холодный компресс на лоб и меняйте по мере нагревания. 6. Создайте поток свежего воздуха. 7. При рвоте поверните ребенка на бок или на живот.

Первая помощь, если ребенок съел грибы на улице

Ядовитые грибы: мухоморы, бледные и зеленые поганки, ложные опята. Отравиться можно и условно съедобными грибами, если съесть их сырыми: строчки, сморчки, свинушки, волнушки, сыроежки.

Симптомы отравления: тошнота, рвота, разлитая боль в животе, диарея, потеря сознания.

Первая помощь:

1. Вызвать медработника детского сада, если его нет – звонить в скорую помощь – **112, 103**.
2. Дать выпить большое количество теплой кипяченой воды, затем вызвать рвоту.
3. Собрать остатки гриба, чтобы медики видели, что именно съел ребенок.